

1. При лица, заболели от COVID-19 след прилагане на първа доза от ваксините с двудозов режим на имунизация, втората доза ваксина се поставя не по-рано от 3 месеца след лабораторно потвърждаване на диагнозата.
2. Преболедували от COVID-19 могат да се ваксинират с пълна имунизационна схема не по-рано от 3 месеца след лабораторно потвърждаване на диагнозата.
3. Бустерна доза ваксина след завършен ваксинационен курс се прилагане не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 6 месеца от датата на поставяне на втората доза (при двудозовите ваксини) и първа доза (при еднодозовите ваксини).
4. иРНК ваксина може да се поставя като бустерна доза след завършен ваксинационен курс с иРНК или векторна ваксина.
5. Във връзка с установения повишен риск от миокардит и перикардити при юноши и млади мъже след прилагане на иРНК ваксини, проявен макар в много редки случаи, преимуществено при прилагане на Spikevax, при мъже до 30 години да се предпочита бустер Comirnaty.
6. При хомоложна, както и при хетероложна ваксинационна схема, бустерната доза от ваксината Spikevax е 0,25 ml, съдържаща 50 микрограма иРНК, което е половината от първичната доза (одобрено в КХП на ваксината).