

Имунизационен календар на Република България																
Възраст	В месеци										В години – календарната година на навършване на възрастта					
	при раждането	от първия месец	от втория месец	от третия месец	от четвъртия месец	от шестия месец	от седмия месец	от дванадесетия месец	от тринадесетия месец	от шестнадесетия месец	6	7	11	12	17	25+
туберкулоза (БЦЖ)	БЦЖ (2)						БЦЖ (3)					БЦЖ (4)	БЦЖ (4)		БЦЖ (4)	
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа)			ДТКа	ДТКа	ДТКа					ДТКа (8)	ДТКа			Тд	Тд	Тд (9)
полиомиелит (Пи)			Пи	Пи	Пи					Пи (8)	Пи					
Хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ)			ХИБ	ХИБ	ХИБ					ХИБ (8)						
вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б)	Хеп. Б(1)	Хеп. Б(5)	Хеп. Б(6)	Хеп. Б(6)	Хеп. Б(6)	Хеп. Б(5)										
пневмококови инфекции (Пневмо)			Пнев-мо	Пнев-мо	Пнев-мо			Пнев-мо (7)								
морбили, паротит, рубеола (МПР)									МПР					МПР		

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.

(2): От 48-ия час след раждането.

(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.

(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.

(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.

(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.

(7): Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием.

(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.

(9): Реимунизация през 10 години.“